

Compoziție 100 ml de soluție injectabilă conține 32,82 g gluconat de calciu , 8,13 g glicerofosfat de calciu , 4,18 g clorură de magneziu (100 ml de soluție conține 4,6 g calciu , 0,5 g magneziu , 1,2 g fosfor) .

Indicații • Hipocalcemie și pareze puerperale • Tetanie : în timpul gestației, lactației, tetania de iarbă și transport • Perturbari ale metabolismului Ca, P, Mg în special în perioada gestației; rahitism și osteomalacie , • Alergii, toxicoze, hemoglobinurie puerperală, Mobus maculosus , urticarie, exantem , diateza hemoragică și hematurie • Pareze consecutive deficitelor fosfocalcice de etiologii diverse • Terapie suplimentară în intoxicațiile cu plumb, fluor și acid oxalic

Doze și mod de administrare Cabaline 500 kg 80-100 ml i.v. Bovine 500 kg 80-100 ml i.v., i.m., s.c. Ovine, caprine 15- 25 ml i.v., i.m., s.c. Porcine 15- 25 ml i.v., i.m., s.c. Porcei 2- 3 ml i.m. , s.c.

Precauții În hipercalcemie, acidoză, afecțiuni renale grave, supraexcitabilitate nervoasă, fibrilație ventriculară. În cazul administrării i.m. și s.c. cantitatea maximă într-un punct va fi de 50 ml ; tratamentul se poate repeta, dacă este necesar, după 24 de ore. Nu se va administra simultan cu produse pe baza de digitală.

Contraindicații În hipercalcemie, acidoză, afecțiuni renale grave, supraexcitabilitate nervoasă, fibrilație ventriculară. În cazul administrării i.m. și s.c. cantitatea maximă într-un punct va fi de 50 ml ; tratamentul se poate repeta, dacă este necesar, după 24 de ore.

Nu se va administra simultan cu produse pe baza de digitală.

Prezentare Flacoane conținând 50 ml și 100 ml soluție .
Timp de așteptare Carne și lapte – fără restricții.

Specie: Rumegătoare, suine, cabaline