

**Compoziție:**

Acepromazină maleat0,500 g
 Alcool benzilic1 g
 Excipienți.....100 ml

Utilizare: cale intramusculară sau intravenoasă

Proprietăți:

Substanța activă din Calmivet Injectabil, Acepromazina maleat prezintă următoarele caracteristici:

- O acțiune predominant subcorticală la nivelul hipotalamusului, de tip adrenergic (simpatolitic).
- O acțiune de depresivă inhibitoare asupra componentelor sistemului mezoencefalic ce controlează metabolismul de bază, temperatura corpului, tonusul vaso-motor și centrul vomitiv.
- O acțiune de depresivă (inhibitoare) asupra sistemului nervos central și periferic.

Aceste proprietăți generale produc următoarele acțiuni terapeutice:

- Acțiune neuroplegică: inhibarea fenomenelor adrenergice (hipertermie, hipertensiune, tahicardie) în timpul fazei hipersimpaticotonice a stresului, reducerea reflexului de vomă.
- Acțiune psihică: se observă o anumită stare de indiferență și o lipsă de interes, urmate de dispariția agitației și a agresivității cauzate de factori ambientali sau de origine centrală sau centro-medulară.
- Efecte asupra motricității: relaxare musculară și nervoasă, diminuarea reflexelor și a percepției durerii.

Specii țintă:

Cai de curse și agrement

Pisici

Căini

Indicații de folosire, în funcție de speciile țintă:

Pre-anestezie

Tranchilizare

Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune:

Vezi contraindicațiile.

Posologie:

CAI DE CURSE ȘI DE AGREMENT

Sedare ușoară sau preanestezie

I.v. 1 ml Calmivet (5mg acepromazina) / 100 kg

I.m. 2 ml Calmivet (5mg acepromazina) / 100 kg

Sedare profundă

I.v. 2 ml Calmivet (10mg acepromazina) / 100 kg

I.m. 4 ml Calmivet (20mg acepromazina) / 100 kg

CĂINI - PISICI

Sedare ușoară sau preanestezie

I.v., i.m. 0,5 ml Calmivet (2,5 mg acepromazina) / 10 kg

Sedare profundă

I.v., i.m. 1 ml Calmivet (5 mg acepromazina) / 10 kg

Mod de administrare:

Cale intravenoasă: Timp de latență scurt: 5 - 7 minute.

Cale intramusculară: timp de latență: 20 - 30 minute.

Durata acțiunii este sensibil egală pentru diferitele moduri de administrare: în medie, 10 ore.

Recomandări:

Doza este individualizată la fiecare animal.

Premedicația în vederea anesteziei generale se va face în limitele dozelor indicate în rubricile „Sedare ușoară sau Preanestezie”.

A se administra în doze reduse și cu precauție în situație de sindrom hemoragic sau post- hemoragic, în situație de depresie gravă, în manifestările alergice puternice, în afecțiuni cardice sau hepatice.

Contraindicații:

A nu se administra la animalele a căror carne și / sau produse sunt destinate consumului uman.

A nu se utiliza împreună cu substanțele organo-fosforice și cu clorhidratul de procaină, cărora le potențează toxicitatea.

Timp de așteptare: vezi rubrica „Contraindicații”.

Flacon de 50 ml

Termen de valabilitate: 3 ani

Producator: VETOQUINOL S.A., BP 159, 70204 LURE CEDEX - France

Partenerul medicilor veterinarilor și al crescătorilor de animale.