

CANVAC R inj. ad.us. vet.

Numele produsului: CANVAC R inj. ad.us. vet.

Vaccin antirabic inactivat.

Compoziție (substanțe active, excipienți):

o (1) doză de vaccin conține

Substanțe active

Virus rabie inactivat în cantitate NLT 2 IU pentru fiecare doză vaccinală;

Excipienți:

Oxid de aluminiu, hidratat (algeidrat) NLT 1,4 mg;

Tormersol NMT 0,1 mg.

Soluție de coajură de soia

Dozaj și formă de prezentare: O soluție injectabilă pentru administrare parenterală.

Tipul ambalajului:

1 ml de vaccin constituie o (1) doză.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum efectiv de 3 ml conținând (1) doză adică 1 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 10 ml conținând 10 doze adică 10 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 20 ml conținând 20 doze adică 20 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 50 ml conținând 50 doze adică 50 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 100 ml conținând 100 doze adică 100 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 200 ml conținând 200 doze adică 200 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 500 ml conținând 500 doze adică 500 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 1000 ml conținând 1000 doze adică 1000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 2000 ml conținând 2000 doze adică 2000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 5000 ml conținând 5000 doze adică 5000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 10000 ml conținând 10000 doze adică 10000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 20000 ml conținând 20000 doze adică 20000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 50000 ml conținând 50000 doze adică 50000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 100000 ml conținând 100000 doze adică 100000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 200000 ml conținând 200000 doze adică 200000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 500000 ml conținând 500000 doze adică 500000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 1000000 ml conținând 1000000 doze adică 1000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 2000000 ml conținând 2000000 doze adică 2000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 5000000 ml conținând 5000000 doze adică 5000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 10000000 ml conținând 10000000 doze adică 10000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 20000000 ml conținând 20000000 doze adică 20000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 50000000 ml conținând 50000000 doze adică 50000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 100000000 ml conținând 100000000 doze adică 100000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 200000000 ml conținând 200000000 doze adică 200000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 500000000 ml conținând 500000000 doze adică 500000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 1000000000 ml conținând 1000000000 doze adică 1000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 2000000000 ml conținând 2000000000 doze adică 2000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 5000000000 ml conținând 5000000000 doze adică 5000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 10000000000 ml conținând 10000000000 doze adică 10000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 20000000000 ml conținând 20000000000 doze adică 20000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 50000000000 ml conținând 50000000000 doze adică 50000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 100000000000 ml conținând 100000000000 doze adică 100000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 200000000000 ml conținând 200000000000 doze adică 200000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 500000000000 ml conținând 500000000000 doze adică 500000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 1000000000000 ml conținând 1000000000000 doze adică 1000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 2000000000000 ml conținând 2000000000000 doze adică 2000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 5000000000000 ml conținând 5000000000000 doze adică 5000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 10000000000000 ml conținând 10000000000000 doze adică 10000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 20000000000000 ml conținând 20000000000000 doze adică 20000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 50000000000000 ml conținând 50000000000000 doze adică 50000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 100000000000000 ml conținând 100000000000000 doze adică 100000000000000 ml de vaccin.

Fiacone medicinale din sticlă sau plastic cu volum de 200000000000000 ml conținând 200000000000000 doze adică 200000000000000 ml de vaccin.

precis: pentru câini, pisici, animale de blană, vaci, capre, porci și cai.

Contraindicații: Vaccinarea trebuie evitată în stadiul bolii pentru animalul imunizat și de aceea vaccinarea nu trebuie practică decât dacă la animal s-a stabilit că este sănătos. De aceea vaccinarea este contraindicată în următoarele situații:

- boli infecțioase acute,
- boli organice sau cu evoluție febrilă,
- atunci când reacții post-vaccinale nefavorabile, de ex: reacții secundare sau alergii la vaccinări anterioare au fost înregistrate,
- la animale expuse la stres (transport, temperaturi ambientale crescute).

Modificări de comportament ale animalelor: Produsul nu afectează comportamentul animalelor.

Interacțiuni: Vaccinul poate fi utilizat de o manieră modulară. El poate fi administrat simultan sau împreună (amestecat) cu alte vaccinuri similare. Cu toate acestea trebuie reținut că răspunsul imun scade în intensitate pe măsură ce numărul de antigene crește. Administrarea altor medicamente nu influențează eficiența vaccinului.

Dozaj: Doza pentru 1 animal este de 1 ml indiferent de specie, vârstă, sex sau greutate corporală. Carnivorile tinere născute din mame nevaccinate trebuie vaccinate la vârsta de o lună. La animalele născute din mame vaccinate la care existența imunității colostrale poate fi evaluată vor fi vaccinate la vârsta de 5 luni. Dacă vor fi vaccinate înainte de această vârstă vor trebui revaccinate la 4-6 săptămâni. Revaccinarea anuală este necesară pentru a menține o imunitate permanentă. De aceea animalele trebuie revaccinate repetat în fiecare an. La biogăurile și solpede se recomandă ca vaccinarea să se facă după dispariția imunității colostrale, care la majoritatea speciilor se petrece între 3 și 9 luni. La aceste animale, dacă provin din mame nevaccinate se recomandă vaccinarea la vârsta de 2 luni și repetarea vaccinării la 14 zile până la 1 lună de la prima vaccinare. Revaccinarea anuală este necesară pentru a păstra un nivel constant al imunității. În mod obișnuit, o singură administrare este suficientă pentru a induce imunitate la animale adulte. Menținerea acesteia se face prin vaccinare anuală repetată. La animale tinere a căror istoric nu se cunoaște administrarea vaccinului trebuie repetată la 4-6 săptămâni indiferent de stadiul imunității colostrale sau de vârstă.

Calea de administrare: Vaccinul trebuie administrat intramuscular la porci în doză de 1 ml. La câine, pisică, animale de blană, bovine, ovine, caprine și cabaline, vaccinul se administrează subcutanțial, în doză de 1 ml.

Precauții speciale: Puii vaccinați la vârste prea timpurii pot prezenta reacții neadequate la administrarea vaccinului datorită dezvoltării imunocompetenței care la un moment dat poate fi incompletă, ca și datorită efectelor adverse ale imunității colostrale. De aceea animalele ar trebui revaccinate la 4-6 săptămâni de la prima imunizare. Călinii trebuie deparazitați înainte de vaccinare. La carnivorele sălbatice vaccinul poate fi utilizat ca diluant pentru alte vaccinuri împotriva bolilor virale ale acestora. Vaccinarea antirabică trebuie să respecte prevederile legale în vigoare. În caz de efecte secundare se instituie terapie simptomatică. Agitați vaccinul înainte de utilizare.

Reacții adverse: Administrarea altor medicamente nu influențează efectul vaccinării. Uneori administrarea vaccinului poate produce o creștere moderată a temperaturii la nivel de subfebrilă și înapetență trecătoare. Rareori se pot produce reacții locale la locul de administrare care dispar în 14 zile consecutiv vaccinării.

Valabilitate: Produsul trebuie utilizat înainte de data indicată pe eticheta fiecărui flacon adică în 24 luni de la data fabricării. Vaccinul nu trebuie utilizat după data de expirare a valabilității. Fiacone de o doză trebuie utilizate imediat după desigilarea flaconului. Fiacone cu capacitate mai mare trebuie utilizate cât mai repede posibil de la desigilare, dar fără a se depăși 10 ore de la prima utilizare.

Păstrare: La loc uscat și întunecat la temperaturi de la 2 la 8°C, ferit de îngheț.

Ultima revizuire a textului: 15.07.2003

Specifitate: câini, pisici, animale de blană, bovine, ovine, caprine, cai și porci.

Îndepărtarea produsului neutilizat și la ambalajelor: conform legislației în vigoare.

Termen de așteptare și perioadă pentru mediu înconjurător: Nu există timp de așteptare. Vaccinul nu este dăunător mediului înconjurător.

Producător: Dyntec spol. s r.o., Pražská 328, 411 55 Terezín, Republica Cehă

Importator: S.C. Biotec Exim S.R.L., Sosaua Turmu Măgurele, km 5, Alexandria-Teleorman, România, tel / fax +40 247.421.050

Numărul autorizației: 070294 / 10.09.2007