

tratamentul febrei, durerii, starilor de slabiciune si epuizare, infectiilor si intoxicatiilor precum septicemia acuta si severa, septicemia puerperala, diaree, pneumonii, acetonemia, boli de transport,

febra laptelui si pare
Descriere:

COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA

1 ml contine:

Substante active:

Metamizol sodic	40,00 mg
Cafeina	3,50 mg
Gluconat de calciu	100,00 mg
Gluconat de magneziu	10,00 mg
Sodiu dihidrogen fosfat dihidrat	4,02 mg
Acetilmetionina	40,00 mg
Glucoza (ca monohidrat)	181,82 mg

Excipienti:

Alcool benzilic 10,50 mg

Solutie perfuzabila, de culoare galbuie

Specii tinta: Cabaline, bovine, suine

Indicatii pentru utilizare, cu specificarea speciilor tinta:

Novacoc forte se recomanda in tratamentul febrei, durerii, starilor de slabiciune si epuizare, infectiilor si intoxicatiilor precum septicemia acuta si severa, septicemia puerperala, diaree, pneumonii, acetonemia, boli de transport, febra laptelui si pareze, hemoglobinurie.

Utilizarea produsului Novacoc forte in completare la tratamentul de baza antiinfectios, s-a dovedit frecvent decisiva in salvarea vietii animalului.

Contraindicatii:

Nu se utilizeaza in caz de hipersensibilitate la substantele active sau la oricare dintre excipienti. Afectiuni grave ale ficatului si rinichilor, modificari ale hematopoezei, insuficienta cardiaca si aritmii.

Atentionari speciale pentru fiecare specie tinta:

Nu exista.

Precautii speciale pentru utilizare la animale

Asigurați perfuzarea intravenoasă lentă la temperatura corpului în timp ce supravegheați

cardiac. Întrerupeți perfuzarea în caz de tahicardie și aritmie cardiacă.

Precautii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

în caz de autoinjectare accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Perfuzarea prea rapidă poate avea ca rezultat tahicardia și aritmia cardiacă.

Utilizare în perioada de gestație și lactație Novacoc forte poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Efectul glicozidelor cardiace și adrenergice (etilefrine) este intensificat prin creșterea cantității de calciu. Aritmiile cardiace pot apărea la administrarea simultană a narcoticelor de inhalatie. Metamizolul poate intensifica efectul anticoagulantelor și poate atenua pe cel al furosemidului. Gluconatul de magneziu atenuează efectul aminoglicozidelor și al tetraciclinelor și intensifică acțiunea de blocare neuromusculară a aminoglicozidelor și a narcoticelor de inhalatie. Căfeina intensifică efectul glicozidelor cardiace.

Cantități de administrat și calea de administrare

Perfuzati lent la temperatura corpului.

Cai de greutate medie și grei	150 - 250 ml
Cai usori (200-350 kg)	100 - 150 ml
Cai mici	până la 100 ml
Bovine	(până la) 250 ml
Tineret bovin	80-100 ml
Vitei sugari	50-70 ml
Scroafe de reproducere	50 ml
Porci la îngrășat	30 ml
Tineret porcine	20 ml

Produsul se administrează o dată pe zi și poate fi repetat timp de câteva zile, în funcție de evoluția bolii.

în caz de boli infecțioase este recomandată utilizarea în combinație cu antibiotice sau trimetoprim / preparate sulfonamidice.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Efectele nedorite sunt în primul rând cauzate de perfuzările prea rapide. Acestea includ colapsul circulator, aritmiile cardiace, dispneea, spasmele, slăbiciunea musculară. În aceste cazuri, întrerupeți perfuzarea și dacă este necesar începeți tratamentul simptomatic.

Timp de așteptare:

Carne și organe:

Porcine:	6 zile
Bovine:	13 zile
Cabaline:	6 zile
Lapte fbovine:	2,5 zile (5 mulsori)

Specie: Bovine, suine, cabaline