

# PG 600®

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

96520A 0033.740.2600



## DESCRIERE

PG 600 se prezintă sub forma unui flacon cu pulbere cristalină, albă, liofilizată însotită de un flacon cu solvent.

## COMPOZITIE

Fiecare doză conține 400 u.i. gonadotrofină serică (PMSG) și 200 u.i. gonadotrofină corionica (CG). Volumul solventului însotitor este de 5 ml/doză.

## MOD DE ACȚIUNE

PG 600 combină doi hormoni cu importanță în dezvoltarea foliculilor și în ovulația lor. Gonadotrofina serică stimulează dezvoltarea foliculilor, gonadotrofina corionica promovează ovulația și formarea corpului galben. La porc, combinarea acestor hormoni asigură dezvoltarea unui ciclu estral normal.

## INDICAȚII

| Specificare | Indicație                                      | Timp de tratament  |
|-------------|--|--|
| Scroafe     | Starter al ciclului                            | În ziua întârcării   |
|             | Creșterea nr. de porcii pe cuib/Subfertilitate | În ziua întârcării   |
|             | Anestru  | 10 zile după întârcare   |
| Scrofite    | Diagnosticul gestației                         | În interval de 80 de zile după montă sau însămânțarea artificială  |
|             | Anestru  | La vîrstă de 8-10 luni   |
|             | Inducerea estrului                             | La vîrstă de 5,5-6,5 luni și/sau la o greutate corporală de 100 kg |
|             | Diagnosticul gestației                         | În interval de 80 de zile după montă sau însămânțarea artificială  |

Utilizarea PG 600 pentru toate indicațiile menționate va induce estrul la 3-6 zile după tratament.

## CONRAINDECAȚII

Nu sunt.

## EFFECTE ADVERSE

Nu sunt.

## DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Fiaconul cu pudră liofilizată se reconstituie folosind conținutul fiaconului de solvent. Solutia se injectează s.c. sau i.m. la nivelul gâtului, înapoi urechii.

## PERIOADA DE AȘTEPTARE

Came: 0 zile

## INCOMPATIBILITĂȚI ȘI INTERACȚIUNI

Trebuie evitat amestecul cu alte substanțe.

## PRECAUȚII

Nu se impun.

## SUPRADOZARE

La doze duble nu apar simptome clinice.

## PĂSTRARE

Liofilizat : în frigider (2-8°C) și la întuneric.

Reconstituit: 12 ore la temperatură de 8-15°C și la întuneric.

## PREZENTARE

Cutie cu 5 flacoane de 1 doză și 5 flacoane cu solvent.

Cutie cu 1 flacon cu 5 doze și 1 flacon cu solvent.

## PRECAUȚII PENTRU PRODUSUL NEÎNTRBUINTAT ȘI AMBALAJE

Nu se impun.

Nr. și dată Licență: 39186/08/01/1996

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Intervet

96520A 10.97

Proprietar - Producător - Ambalator:

Intervet International B.V.

BOXMEER - HOLLAND

Informații suplimentare:

Intervet Reprezentanță pentru România - București

Tel. 01.212.27.12